

Breath test Urea - Helicobacter Pylori

Il breath test all'urea viene eseguito generalmente al mattino, dopo un digiuno di almeno 6 ore se adulto, 3 se bambino. Il giorno dell'esame è importante lavarsi accuratamente i denti, astenersi dal **fumo** e dall'assunzione di **caffè**.

L'urea Breath Test per la diagnosi di Helicobacter Pylori è completamente indolore e dura in media trenta minuti.

L'unica regola di preparazione all'esame prevede, salvo diversa indicazione medica, l'astensione:

- per tre settimane dall'uso di **antibiotici** associati e inibitori della **pompa protonica**
- per una settimana dall'uso di farmaci **gastroprotettori** appartenenti alla classe degli inibitori della pompa protonica o degli **H2 antagonisti**, oltre al sucralfato (sono quindi da evitare specialità farmaceutiche contenenti cimetidina, ranitidina, pirenzepina, nizatidina, lansoprazolo, rabeprazolo, pantoprazolo, omeprazolo, esomeprazolo, sucralfato, di cui segue una lista: antepsin, antra, axagon, biomag, brumetidina, buscopan antiacido, citimid, citronizat, controloc, crafilm, cronizat, dina, ermes, esopral, etideme, eugastran, eureceptor, famodil, frilans, gastralgin, gastridin, gastrogel, lansox, leblon, levogenix, limpidex, lomevel, losec, lucen, mepral, motiax, nansen, neoh 2, nexium, nizax, notul, omeprazen, pantecta, pantoloc, pantopan, pantorc, pariet, peptazol, peptirex, pergastrid, raniben, ranibloc, ranidil, ranidiz, roxit, sensigard, stomet, sucralfin, sucramal, sucrate, sucroril, suril, tagamet, temic, ulcedin, ulcestop, ulcex, ulcodina, ulcomedina, ulcrast, ulis, zanizal, zantac, zoton). Consultare il medico per ulteriori e più precise indicazioni.